

MEHR BOLFO®. WENIGER PARASITEN.

SCHUTZ AM TIER



SCHUTZ IN DER UMGEBUNG



SCHUTZ DURCH VORBEUGUNG



Bolfo® Umgebungspray und Bolfo® Fogger gegen Flöhe bei Hunden und Katzen. Bolfo® Umgebungspray und Bolfo® Fogger nicht am Tier anwenden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 06/2015.

Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für Katzen und kleine Hunde, Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für große Hunde, Bolfo® Flohschutz-Shampoo, Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray. Wirkstoff: (2-Isopropoxyphenyl)(methylcarbamat). Für Tiere: Hunde und Katzen. Anwendungsgebiete: Zecken- und Flohschutzband: Zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Katzen und Hunden. Das Puderband setzt den Wirkstoff kontinuierlich frei. Flöhe werden innerhalb weniger Stunden nach Anlegen des Halsbandes abgetötet. Angesaugte Zecken werden nach etwa einem Tag abgetötet. Sie können dann leicht entfernt werden oder fallen spontan ab. In Einzelfällen ist während des Tragens des Halsbandes ein Befall mit Zecken möglich, die sich allerdings nur einbohren und abfallen, ohne in der Regel Blut gesaugt zu haben. Wirkungsdauer gegen Flöhe: bis zu 4 Monate. Wirkungsdauer gegen Zecken: bis zu 10 Wochen. Flohschutz-Spray: Zur Bekämpfung von Flöhen bei Hunden und Katzen. Flohschutz-Shampoo: Zur Bekämpfung von Flöhen bei Hunden. **Warnhinweis:** Tiere, die ein Bolfo® Zecken- und Flohschutzband tragen, sind von Kleinkindern und Säuglingen fernzuhalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 02/2016.

Bolfo Spot-On Fipronil Lösung zum Auftropfen für Katzen, für kleine, mittelgroße, große und sehr große Hunde. Anwendungsgebiete: Katzen; Zur Behandlung von Katzen gegen Flohbefall (*Ctenocephalides felis*). Das Tierarzneimittel zeigt eine sofortige und bis zu 5 Wochen anhaltende insektizide Wirksamkeit gegen Neubefall mit adulten Flöhen. Das Tierarzneimittel zeigt innerhalb von 48 Stunden eine akarizide Wirksamkeit mit abtötender Wirkung gegen Zecken (*Ixodes ricinus*). Hunde; Zur Behandlung von Hunden gegen Flohbefall (*Ctenocephalides felis*). Das Tierarzneimittel zeigt eine sofortige und bis zu 8 Wochen anhaltende insektizide Wirksamkeit gegen Neubefall mit adulten Flöhen. Die akarizide Wirksamkeit gegen *Ixodes ricinus* hält bis zu 2 Wochen, gegen *Rhipicephalus sanguineus* bis zu 3 Wochen und gegen *Dermacentor reticulatus* bis zu 4 Wochen an. Sind Zecken dieser Arten zum Zeitpunkt der Anwendung vorhanden, werden nicht alle Zecken in den ersten 48 Stunden abgetötet, sondern möglicherweise erst innerhalb einer Woche. **Warnhinweise:** Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. **Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber:** Norbrook Laboratories Limited, Station Works, 11 Camlough Road, BT35 6JP Newry, Co. Down, Vereinigtes Königreich. **Vertreiber:** Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 01/2017. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.

AWB-2051429375 WM-Nr.: 85710311/03/17

WIR BERATEN SIE GERN:



Bolfo® SPOT-ON.

ZECKE-FF.



Erhältlich in Ihrer Apotheke



BOLFO® SPOT-ON.

Einfach wirksam gegen Zecken und Flöhe.

- Effektiver Zecken- und Flohschutz für Katze & Hund
- Einfache und gut verträgliche Anwendung
- Mit dem bewährten Wirkstoff Fipronil

BRAVES HAUSTIER. BÖSE ZECKE.

Die Gefahr Zecke lauert überall: Denn die tückischen Blutsauger haben sich nicht nur in Wäldern, sondern auch auf Wiesen, in Gärten und Parks eingenistet.

In Deutschland sind die folgenden beiden Zeckenarten am häufigsten vertreten:

GEMEINER HOLZBOCK (*Ixodes ricinus*):

- überträgt die Borreliose, Anaplasmose und FSME.
- macht „Jagd“ auf Mensch und Tier.



AUWALDZECKE (*Dermacentor reticulatus*):

- überträgt die Babesiose.
- verfolgt ihren Wirt aktiv!



In Urlaubsländern findet sich zudem häufig die:

BRAUNE HUNDEZECKE (*Rhipicephalus sanguineus*):

- überträgt die Babesiose
- „Mitbringsel“ aus europäischen Mittelmeerländern
- kann in beheizten Häusern oder in Hundezwingern monatelang überleben.



ACHTUNG!

Zecken warten versteckt im Gras oder Gebüsch auf einen geeigneten Wirt, an dem sie sich festklammern. Auf Grund ihrer winzigen Körpergröße von nur wenigen Millimetern werden sie dabei leicht übersehen. So lässt es sich beim Streunen kaum vermeiden, einen ungeliebten Gast mit nach Hause zu bringen.

KLEINER STICH. GROSSE FOLGEN.

Ein Zeckenstich kann schnell gefährlich werden: Einige Parasiten können ihren Wirt beim Blutsaugen mit Erregern schwerwiegender Krankheiten infizieren. Denn diese übertragen sie mit ihrem infizierten Speichel in die Wunde.

Die häufigsten durch Zecken übertragenen Krankheiten sind:

Borreliose:

Symptome: verläuft häufig zunächst ohne spezifische und eindeutige Anzeichen.

Folgen: Gelenk-Arthritis mit einhergehender Lahmheit, später Schädigungen der Nieren und des Herzens.

→ Die Krankheit verläuft oft chronisch.

FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis):

Symptome: Fieber, neurologische Störungen.

Folgen: Es kommt seltener zu klinischen FSME-Fällen bei Hunden. Allerdings sind auch in Deutschland sogar Todesfälle bei Hunden bekannt.

→ Krankheitsanzeichen treten bei Menschen häufiger als bei Hunden auf.

Babesiose:

Mögliche Symptome: nach 1-3 Wochen sehr hohes Fieber, dunkelbrauner Urin, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, häufig Gelbsucht.

Folgen: Blutarmut, Nierenversagen, Augenentzündungen, Bewegungsstörungen, Anfälle.

→ In der akuten Phase kann es zu Todesfällen kommen.



Bolfo® Spot-On

NEU

BOLFO® SPOT-ON. **EINFACH WIRKSAM GEGEN** **ZECKEN UND FLÖHE.**

- Effektiver Zecken- und Flohschutz für Katze & Hund
- Einfache und gut verträgliche Anwendung
- Mit dem bewährten Wirkstoff Fipronil

Sagen Sie Parasiten den Kampf an – mit der passenden Lösung für Ihre Vierbeiner. Dank fünf verschiedener Dosierungsgrößen kann Bolfo® Spot-On effektiv bei Hunden jeder Größe und sogar Katzen eingesetzt werden:

- Gegen Flohbefall
- Bei Flohspeichelallergie
- Gegen Zeckenbefall



FIPRONIL:

- wirkt hemmend an den Nervenzellen der Parasiten und führt so zu unkontrollierter Aktivität ihres Zentralnervensystems und zum Tod.
- ist wasserbeständig, weil der Wirkstoff in den oberen Hautschichten und in den Talgdrüsen gebunden wird.



SPOT-ON. **ZECKE-OFF.**

Beim Spot-On-Verfahren tragen Sie die Lösung direkt auf die Haut Ihres Vierbeiners auf. Von dort verteilt sich der Wirkstoff innerhalb von 24 bis 48 Stunden über den gesamten Körper.



Und so geht's:

- 1 Entnehmen Sie die Pipette aus der Packung und knicken Sie die Pipettenspitze zum Öffnen um.
- 2 Scheiteln Sie das Fell zwischen den Schulterblättern, bis die Haut sichtbar wird.
- 3 Setzen Sie die Pipettenspitze direkt auf die Haut auf und drücken Sie den Inhalt vorsichtig heraus. Massieren Sie die Lösung nicht ein.
- 4 Vermeiden Sie versehentliches Rücksaugen der Lösung in die Pipette.

TIPP Unser Tipp für optimale Wirksamkeit:
Verzichten Sie 48 Stunden vor und nach der Behandlung auf das Baden und Shampooieren Ihres Haustiers.

WICHTIGER HINWEIS:

Applizieren Sie Bolfo® Spot-On an einer Stelle, die das Tier nicht ablecken kann. Achten Sie zudem darauf, dass behandelte Tiere sich nicht gegenseitig ablecken können.

