



Bei Windpocken, Nesselsucht und allergischem Schnupfen!

Fenistil® Tropfen, Fenistil® Dragees

- » Lindert histaminbedingten oder windpockenassoziierten Juckreiz, Nesselsucht sowie allergischen Schnupfen
- » Beruhigt durch den Tag

Tipp

Kann gegebenenfalls auch anstelle von Fenistil® 24-Std Kapseln empfohlen werden

Anwendungsalter

Tropfen ab 1 J., Dragees ab 3 J.
Achtung: bei allerg. Schnupfen ab 6 J.

Anwendung⁵

Tropfen: 3 x täglich 10–15 Tropfen (1–8 J.) oder 20–40 (ab 9 J.)
Dragees: 3 x täglich 1 Dragee (3–12 J.) oder 2 Dragees (ab 12 J.)

Anwendungsdauer

Unbegrenzt; symptomatische Anwendung



Gegen Juckreiz & Insektenstiche mit Kühleffekt!

Fenistil® Gel

- » Der Klassiker bei Insektenstichen
- » Lindert lästigen Juckreiz schnell und langanhaltend mit angenehmen Kühleffekt
- » Zieht schnell ein
- » Gut verträglich: ohne Alkohol, Duftstoffe und Farbstoffe
- » Für alle Hauttypen

Tipp **Nicht kratzen!**

- » Haut wird geschädigt
- » Juckreiz und Infektions-/Entzündungsrisiko nimmt zu

Anwendungsalter

Keine Altersbeschränkung

Anwendung

Bis zu 3 x täglich auftragen

Anwendungsdauer

Unbegrenzt; symptomatische Anwendung



Praktisch für unterwegs und für die ganze Familie!

Fenistil® Kühl Roll-On

- » Lindert Juckreiz & Brennen durch Kühleffekt
- » Praktisch für unterwegs
- » Ideal für Kinder
- » Für alle Hauttypen

Tipp **Nicht kratzen!**

- » Haut wird geschädigt
- » Juckreiz und Infektions-/Entzündungsrisiko nimmt zu
- » Nicht auf entzündeter Haut anwenden

Anwendungsalter

Keine Altersbeschränkung

Anwendung

Mehrmals täglich bei Bedarf dünn auf die betreffenden Hautstellen auftragen.

Anwendungsdauer

Unbegrenzt



Gegen Juckreiz und Entzündung das ganze Jahr!

FeniHydrocort® Creme 0,5%

- » Bekämpft gezielt mäßig ausgeprägte entzündliche Hauterkrankungen und lindert Juckreiz, Rötung und Schwellung schnell und langanhaltend
- » Vielseitig: eignet sich für akute und chronische Hautentzündungen, z.B. entzündete Insektenstiche, Ekzeme, Kontakt-/Sonnenallergien
- » Gut verträglich: ohne Alkohol, Duftstoffe und Paraffine
- » Mit dem Hilfsstoff Dexpanthenol
- » Die Creme zieht besonders schnell ein und pflegt die Haut
- » Für alle Hauttypen

Anwendungsalter

Ab 6 Jahre

Anwendung

1–2 x täglich dünn auftragen

Anwendungsdauer

2 Wochen



Bewährte Niedrigdosierung für Kinder ab 6 Jahre!

FeniHydrocort® Creme 0,25%

- » Bekämpft schnell und effektiv Entzündungssymptome der Haut und lindert Rötungen Juckreiz und Schwellung
- » Für eine längere und großflächige Anwendung (bis max. 10 % der Hautoberfläche) geeignet, z.B. bei Sonnenbrand/-allergie
- » Aufgrund der Niedrigdosierung gut für Kinder geeignet
- » Gut verträglich: ohne Alkohol, Duftstoffe und Paraffine
- » Ökotesturteil „sehr gut“
- » Für alle Hauttypen

Anwendungsalter

Ab 6 Jahre

Anwendung

1–2 x täglich dünn auftragen

Anwendungsdauer

4 Wochen



Die **Nr. 1** in der Arztverordnung¹, in der Apothekenempfehlung², im Markt³ – mit 93% zufriedenen Kunden⁴

Stark gegen Juckreiz und Hautentzündungen und dabei **sanft** zur Haut

- Frei von reizenden Inhaltsstoffen wie Alkohol und Duftstoffen
- Frei von okklusiven Inhaltsstoffen wie Paraffine (z. B. Vaseline)
- Mit dem pflegenden Hilfsstoff Dexpanthenol (bei FeniHydrocort® 0,5%)

Vielseitige Anwendung für das ganze Jahr, somit ideal für jede Haus- und Reiseapotheke

Für alle Hauttypen geeignet

Fenistil® Tropfen 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen (Wirkstoff: Dimetindenmaleat). **Zus.:** 1 ml Lösg. enth. 1 mg Dimetindenmaleat. Sonst. Bestand.: Ger. Wasser; Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat; Citronensäure-Monohydrat; Benzoesäure; Natriumedetat; Saccharin-Natrium; Propylenglykol. **Ind.:** Zur symptom. Linderung von: histaminbed. Juckreiz, windpockenassoz. Juckreiz bei Kleinkindern, allerg. Schnupfen b. Patienten über 6 J., Nesselsucht (Urtikaria), Insektenstichen. **Kontraind.:** Absolut: Überempfindlichkeit gg. über Dimetindenmaleat o. sonst. Bestandteil. Säuglinge u. Kdr. < 1 J. Relativ: Glaukom, angeborene bzw. erworbene Blasenhalstenose (Prostatahyperplasie), Epilepsie. Schwangerschaft, Stillzeit. **Nebenw.:** Sehr häufig: Müdigkeit. Häufig: Schläfrigkeit, Nervosität. Selten: Erregung, Kopfschmerzen, Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, trockener Mund, trockener Rachen. Sehr selten: Allerg. Reakt. Anaphylaktoide Reakt. einschl. Gesichtssödem, Pharynxödem, Hautausschlag, Muskelkrämpfe u. Atemnot. **Cave:** Schläfrigkeit kann besonders am Behandl.-beginn auftreten. **Handelsf.:** 20 ml; 50 ml; 60 (3x20) ml Lösung. Apothekenpflichtig Referenz: FEN10-F04

Fenistil® Dragees 1 mg pro überzogene Tablette für Kinder ab 3 J. u. Erwachsene (Wirkstoff: Dimetindenmaleat). **Zus.:** 1 überzogene Tbl. enth. 1 mg Dimetindenmaleat. Sonst. Bestand.: Lactose-Monohydrat; Saccharose; Talkum; mikrokristalline Cellulose; Macrogol 35.000; Glucosesirup; Titandioxid; Magnesiumstearat; Povidon 29.000; hochdisp. Siliciumdioxid; Montanglycolwachs; Gelatine. **Ind.:** Zur symptom. Linderung von: histaminbed. Juckreiz; windpockenassoz. Juckreiz bei Kleinkindern; allerg. Schnupfen b. Patienten über 6 Jahren; Nesselsucht (Urtikaria). **Kontraind.:** Überempfindlichkeit gegenüber Dimetindenmaleat o. sonst. Bestandteil; Kinder unter 3 J. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:** Glaukom, Blasenhalstenose (Prostatahyperplasie). Epilepsie. Jüngere Kinder: Erregungszustände mögl. Enth. Glucose, Saccharose (Zucker) u. Lactose, daher keine Einnahme bei hereditärer Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption, Lactase-Mangel, Galactose-Intoleranz o. Saccharase-Isomaltase-Mangel. **Schwangerschaft und Stillzeit:** strenge Indikationsstellung. **Stillzeit:** nicht empfohlen. **Nebenw.:** Schläfrigkeit, bes. am Behandlungsbeginn. Sehr selten allerg. Reaktionen. Immunsystem: sehr selten anaphylaktoide Reakt. einschl. Gesichtss-, Pharynxödem, Hautausschlag, Muskelkrämpfe, Atemnot. Psychiatr. Erkrankungen: Selten Erregungszustände. Nervensystem: Sehr häufig Erschöpfung. Häufig Schläfrigkeit, Nervosität. Selten Kopfschmerzen, Schwindel. Gastrointestinal: Selten Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, trockener Mund bzw. Rachen. **Handelsf.:** 20, 50 bzw. 100 Dragees. Apothekenpflichtig Referenz: FEN4-F02

Fenistil Gel 1 mg/g (Wirkstoff: Dimetindenmaleat). **Zus.:** 1g Gel enth. 1 mg Dimetindenmaleat. Sonstige Bestand.: gereinigtes Wasser; Propylenglycol; Carbomer 980; Natriumhydroxid; Methyl-4-hydroxybenzoat (Parabene) **Ind.:** Zur kurzfristigen Linderung von Juckreiz bei kleinen juckenden Insektenstichen auf intakter Haut; Juckreiz bei Hauterkrankungen wie chron. Ekzem, Urtikaria u.a. allerg. bedingte Haut-krankheiten; Verbrennungen 1. Grades; Sonnenbrand. **Kontraind.:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile; großflächige Anwendung; Anwdg. auf geschädigter Haut. **Warnhinweise:** Umfangreich beh. Haut nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen; nicht auf großen, insbes. verletzten od. entzündeten Hautflächen anwenden - dies gilt speziell f. Säuglinge u. Kleinkd. Zur Therapie von bek. Insektengiftallergie system. Formen verwenden. Hautreizungen durch Propylenglycol mgl. Methyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, auslösen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Nicht großflächig, nicht auf verletzte oder entzündete Haut auftragen; bei Stillenden nicht a. d. Brustwarze. **Nebenw.:** Leichte, vorübergehende Hautreaktionen an der Auftragsstelle. Haut und Unterhaut-zellgewebe: Gelegentlich: Trockenheit od. Brennen der Haut. Sehr selten: allerg. Dermatitis. Methyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen auslösen. Weitere Einzelh. s. Fach- und Gebrauchsinfo. **Packungsgr.:** 20 g; 50 g; 100 g. Apothekenpflichtig Referenz: FEN6-F02

Fenistil® Kühl Roll-on Gel zur Kühlung und lokalen Behandlung von Juckreiz und Brennen, z. B. bei Insektenstichen und Sonnenbrand. **Zus.:** Benzalkoniumchlorid-Lösung; Carbomer 974 P; gereinigtes Wasser, Natriumedetat; Natriumhydroxid-Lösung; Propylenglycol. **Kontraind.:** Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, auf verletzter Haut oder Wunden, bei Säuglingen und Kleinkindern nicht auf großen, insbesondere verletzten oder entzündeten Hautflächen. **Nebenw.:** lokale Unverträglichkeitsreaktionen wie Trockenheit oder Brennen. **Warnhinw.:** Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Medizinprodukt. Referenz: FEN16-F01

FeniHydrocort Creme 0,25% / 0,5 % für Erwachsene und Kinder ab dem vollen-deten 6. Lebensjahr (Wirkstoff: Hydrocortison). **Zus.:** 0,25 %: 1 g Creme enth. 2,5 mg Hydrocortison. 0,5 %: 1 g Creme enth. 5 mg Hydrocortison. Sonstige Bestand.: Glycerol 85 %; [(Z)-Octadec-9-en-1-yl]oleat; emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A); mittelkettige Triglyceride; Oc-tyldodecanol; Glycerolmonostearat; Dimeticon; Kaliumsorbat; Carbomer; Natriumedetat; Trometamol; gereinigtes Wasser. 0,5 % zusätzl.: Dexpanthenol. **Ind.:** 0,25 %: Zur Linderung von Entzündungssymptomen d. Haut. 0,5 %: Zur Linderung von mäßig ausgeprägten entzündlichen Hauterkrankungen (Achtung: läng.Anwendg. als 2 Wochen ärztl.Verordnung notwendig). **Kontraind.:** Bekannte Überempf. geg. den Wirkstoff o. sonstige Bestandteile; spezifische Hauterkrankun-gen (z.B. Syphilis, Hauttuberkulose); Virusinfektionen (z.B. Herpes simplex, Herpes zoster, Windpocken); Vakzinationsreaktionen; Rosacea; Mykosen; bakterielle Hautinfektionen; Akne vulgaris, Steroidakne; auf offenen Wunden; auf Schleimhäuten; periorale Dermatitis. 0,25 % zusätzl.: im Auge. 0,5 % zusätzl.: Trimeton. **Nebenw.:** 0,25 %: Selten: Hautreizungen, Überempfindlichkeitsreakt. 0,5 %: Selten: Allergische Hautreakt. 0,25 % / 0,5 %: Bei Anwendg. länger als 4 Wochen sind fol. Nebenw. (Häufigk. nicht bekannt) mögl.: Hautatrophien, Teleangiektasien, Striae, Steroidakne, periorale Dermatitis, Änderung d. Hautpigmentierung, Hypertrichose. **Warnhinw.:** Enthält Cetylstearylalkohol u. Kaliumsorbat. Weitere Einzelh. s. Fach- und Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig Referenz: FEN13-F01

¹ Arztverordnungen im rollierenden Jahr bis Nov. 2015, Institut IMS, Datenerfassung in 4000 Apotheken in Deutschland. ² Apothekenbefragung im Nov. 2015, Institut Konzept und Markt, insgesamt wurden 600 Apotheker und PTA's befragt. ³ Umsatz im Markt für topische Steroide im Jahr 2015, Institut IMS, Datenerfassung in 4000 Apotheken in Deutschland ⁴ GfK Marktforschungsstudie, Dezember 2015. Befragt wurden 75 Apothekenkunden. ⁵ Siehe jeweilige Fachinformation zur detaillierten Dosierung.